

Logic and probability

G. A. Quznetsov

email: lak@cgu.chel.su, quznets@yahoo.com, gunn@mail.ru

Abstract

The propositional logic is generalized on the real numbers field. The logical analog of the Bernoulli independent tests scheme is constructed. The variant of the nonstandard analysis is adopted for the definition of the logical function, which has all properties of the classical probability function. The logical analog of the Large Number Law is deduced from properties of this function.

Логика, истина и вероятность

Г. А. Кузнецов (G. A. Quznetsov)

email: lak@cgu.chel.su, quznets@yahoo.com, gunn@mail.ru

Аннотация

Пропозициональная логика обобщается на поле вещественных чисел. Конструируется логический аналог Схемы независимых испытаний Бернулли. Для определения логической функции, имеющей все свойства классической функции вероятности, применяется один из вариантов нестандартного анализа. Из свойств этой функции получается логический аналог Закона Больших Чисел в форме Бернулли.

1 Введение

Имеется очевидное тесное сходство между классической функцией вероятности и булевой функцией классической пропозициональной логики. А именно, эти функции отличаются только областью значений. Поэтому, если область значений булевой функции расширить от двух-элементного множества $\{0; 1\}$ до отрезка $[0; 1]$ вещественной числовой оси, то логический аналог Закона Больших чисел в форме Бернулли [1] может быть выведен из логических аксиом. А если область значений такой функции расширить до отрезка подходящего варианта гипервещественной числовой оси, то эта теорема даст нестандартное содержание понятия "истина".

2 Нестандартные числа

Рассматриваем множество $\mathbf{N}$ натуральных чисел.

Определение 2.1: n -вход $\mathbf{S}_n$ для $\mathbf{N}$ определяется рекурсивно:

- 1) $\mathbf{S}_1 = \{1\}$;
- 2) $\mathbf{S}_{(n+1)} = \mathbf{S}_n \cup \{n+1\}$.

Определение 2.2: Если $\mathbf{S}_n$ есть n -вход для $\mathbf{N}$, и $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{N}$, то $\|\mathbf{A} \cap \mathbf{S}_n\|$ есть количество элементов множества $\mathbf{A} \cap \mathbf{S}_n$, и если

$$\varpi_n(\mathbf{A}) = \frac{\|\mathbf{A} \cap \mathbf{S}_n\|}{n},$$

то $\varpi_n(\mathbf{A})$ есть частота множества $\mathbf{A}$ на n -входе $\mathbf{S}_n$.

Теорема 2.1:

- 1) $\varpi_n(\mathbf{N}) = 1$;
- 2) $\varpi_n(\emptyset) = 0$;
- 3) $\varpi_n(\mathbf{A}) + \varpi_n(\mathbf{N} - \mathbf{A}) = 1$;
- 4) $\varpi_n(\mathbf{A} \cap \mathbf{B}) + \varpi_n(\mathbf{A} \cap (\mathbf{N} - \mathbf{B})) = \varpi_n(\mathbf{A})$.

Определение 2.3: Если "lim" есть Коши-Вейерштрасса "limit", то:

$$\Phi\mathbf{x} = \left\{ \mathbf{A} \subseteq \mathbf{N} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} \varpi_n(\mathbf{A}) = 1 \right\}.$$

Теорема 2.2: $\Phi\mathbf{x}$ есть фильтр [2], т.е.:

- 1) $\mathbf{N} \in \Phi\mathbf{x}$,
- 2) $\emptyset \notin \Phi\mathbf{x}$,
- 3) если $\mathbf{A} \in \Phi\mathbf{x}$, и $\mathbf{B} \in \Phi\mathbf{x}$, то $(\mathbf{A} \cap \mathbf{B}) \in \Phi\mathbf{x}$;
- 4) если $\mathbf{A} \in \Phi\mathbf{x}$, и $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{B}$, то $\mathbf{B} \in \Phi\mathbf{x}$.

Далее для нашего предмета приспособим понятия и выводы Robinson нестандартного анализа [3]:

Определение 2.4: Последовательности вещественных чисел $\langle r_n \rangle$ и $\langle s_n \rangle$ Q -эквивалентны (обозначение: $\langle r_n \rangle \sim \langle s_n \rangle$), если

$$\{n \in \mathbf{N} \mid r_n = s_n\} \in \Phi\mathbf{x}.$$

Теорема 2.3: Если $\mathbf{r}, \mathbf{s}, \mathbf{u}$ - последовательности вещественных чисел, то:

- 1) $\mathbf{r} \sim \mathbf{r}$,
- 2) если $\mathbf{r} \sim \mathbf{s}$, то $\mathbf{s} \sim \mathbf{r}$;
- 3) если $\mathbf{r} \sim \mathbf{s}$, и $\mathbf{s} \sim \mathbf{u}$, то $\mathbf{r} \sim \mathbf{u}$.

Определение 2.5: Q -число есть множество Q -эквивалентных последовательностей вещественных чисел, т.е. если $\tilde{a}$ - Q -число, и $\mathbf{r} \in \tilde{a}$ и $\mathbf{s} \in \tilde{a}$, то $\mathbf{r} \sim \mathbf{s}$; и если $\mathbf{r} \in \tilde{a}$, и $\mathbf{r} \sim \mathbf{s}$, то $\mathbf{s} \in \tilde{a}$.

Определение 2.6: Q -число $\tilde{a}$ есть *стандартное Q -число* a , если a есть некоторое вещественное число, и существует последовательность $\langle r_n \rangle$, для которой: $\langle r_n \rangle \in \tilde{a}$, и

$$\{n \in \mathbf{N} | r_n = a\} \in \Phi \mathbf{x}.$$

Определение 2.7: Q -числа $\tilde{a}$ и $\tilde{b}$ *равны* (обозначение: $\tilde{a} = \tilde{b}$), если $\tilde{a} \subseteq \tilde{b}$, и $\tilde{b} \subseteq \tilde{a}$.

Теорема 2.4: Пусть $f(x, y, z)$ функция, определенная в $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}$, имеющая область значений в $\mathbf{R}$ ($\mathbf{R}$ - множество вещественных чисел).

Пусть $\langle y_{1,n} \rangle$, $\langle y_{2,n} \rangle$, $\langle y_{3,n} \rangle$, $\langle z_{1,n} \rangle$, $\langle z_{2,n} \rangle$, $\langle z_{3,n} \rangle$ - последовательности вещественных чисел.

В этом случае если $\langle z_{i,n} \rangle \sim \langle y_{i,n} \rangle$, то $\langle f(y_{1,n}, y_{2,n}, y_{3,n}) \rangle \sim \langle f(z_{1,n}, z_{2,n}, z_{3,n}) \rangle$.

Определение 2.8: Обозначим: QR - множество Q -чисел.

Определение 2.9: Функция $\tilde{f}$, определенная в $QR \times QR \times QR$, имеющая область значений в QR , называется *Q -расширением функции* f , определенной в $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}$, имеющей область значений в $\mathbf{R}$, если выполняются следующие условия:

Пусть $\langle x_n \rangle$, $\langle y_n \rangle$, $\langle z_n \rangle$ - последовательности вещественных чисел. В этом случае: если

$$\langle x_n \rangle \in \tilde{x}, \langle y_n \rangle \in \tilde{y}, \langle z_n \rangle \in \tilde{z}, \tilde{u} = \tilde{f}(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}),$$

то

$$\langle f(x_n, y_n, z_n) \rangle \in \tilde{u}.$$

Теорема 2.5: Для всех функций f , определенных в $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}$, имеющих область значений в $\mathbf{R}$, и для всех вещественных чисел a, b, c, d : если $\tilde{f}$ - Q -расширение f ; $\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d}$ - стандартные Q -числа a, b, c, d , то:

если $d = f(a, b, c)$, то $\tilde{d} = \tilde{f}(\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c})$ и vice versa.

По этой теореме: если $\tilde{f}$ - Q -расширение функции f , то выражение " $\tilde{f}(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$ " будет записано как " $f(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$ ", и если $\tilde{u}$ - стандартное Q -число, то выражение " $\tilde{u}$ " будет записано как " u ".

Теорема 2.6: Если для всех вещественных чисел a, b, c :

$$\varphi(a, b, c) = \psi(a, b, c),$$

то для всех Q -чисел $\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}$:

$$\varphi(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}) = \psi(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}).$$

Теорема 2.7: Если для всех вещественных чисел a, b, c :

$$f(a, \varphi(b, c)) = \psi(a, b, c),$$

то для всех $\mathbb{Q}$ -чисел $\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}$:

$$f(\tilde{x}, \varphi(\tilde{y}, \tilde{z})) = \psi(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}).$$

Следствия из Теорем 2.6 и 2.7: [4]: Для всех $\mathbb{Q}$ -чисел $\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}$:

$$\Phi 1: (\tilde{x} + \tilde{y}) = (\tilde{y} + \tilde{x}),$$

$$\Phi 2: (\tilde{x} + (\tilde{y} + \tilde{z})) = ((\tilde{x} + \tilde{y}) + \tilde{z}),$$

$$\Phi 3: (\tilde{x} + 0) = \tilde{x},$$

$$\Phi 5: (\tilde{x} \cdot \tilde{y}) = (\tilde{y} \cdot \tilde{x}),$$

$$\Phi 6: (\tilde{x} \cdot (\tilde{y} \cdot \tilde{z})) = ((\tilde{x} \cdot \tilde{y}) \cdot \tilde{z}),$$

$$\Phi 7: (\tilde{x} \cdot 1) = \tilde{x},$$

$$\Phi 10: (\tilde{x} \cdot (\tilde{y} + \tilde{z})) = ((\tilde{x} \cdot \tilde{y}) + (\tilde{x} \cdot \tilde{z})).$$

Теорема 2.8: $\Phi 4$: Для каждого $\mathbb{Q}$ -числа $\tilde{x}$ существует $\mathbb{Q}$ -число $\tilde{y}$, для которого:

$$(\tilde{x} + \tilde{y}) = 0.$$

Теорема 2.9: $\Phi 9$: Неверно, что $0 = 1$.

Определение 2.10: $\mathbb{Q}$ -число $\tilde{x}$ *Q-меньше* $\mathbb{Q}$ -числа $\tilde{y}$ (обозначение: $\tilde{x} < \tilde{y}$), если существуют последовательности $\langle x_n \rangle$ и $\langle y_n \rangle$ вещественных чисел, для которых: $\langle x_n \rangle \in \tilde{x}$, $\langle y_n \rangle \in \tilde{y}$ и

$$\{n \in \mathbb{N} | x_n < y_n\} \in \Phi ix.$$

Теорема 2.10: Для всех $\mathbb{Q}$ -чисел $\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}$: [5]

$\Omega 1$: неверно, что $\tilde{x} < \tilde{x}$;

$\Omega 2$: если $\tilde{x} < \tilde{y}$, и $\tilde{y} < \tilde{z}$, то $\tilde{x} < \tilde{z}$;

$\Omega 4$: если $\tilde{x} < \tilde{y}$, то $(\tilde{x} + \tilde{z}) < (\tilde{y} + \tilde{z})$;

$\Omega 5$: если $0 < \tilde{z}$, и $\tilde{x} < \tilde{y}$, то $(\tilde{x} \cdot \tilde{z}) < (\tilde{y} \cdot \tilde{z})$;

$\Omega 3'$: если $\tilde{x} < \tilde{y}$, то неверно, что $\tilde{y} < \tilde{x}$, или $\tilde{x} = \tilde{y}$, и vice versa;

$\Omega 3''$: для всех стандартных Q-чисел x, y, z : $x < y$, или $y < x$, или $x = y$.

Теорема 2.11: Ф8: Если $0 < |\tilde{x}|$, то существует Q-число $\tilde{y}$, для которого $(\tilde{x} \cdot \tilde{y}) = 1$.

Таким образом, Q-числа удовлетворяют всем свойствам вещественных чисел, кроме $\Omega 3$ [6]. Свойство $\Omega 3$ несколько ослаблено ($\Omega 3'$ and $\Omega 3''$).

Определение 2.11: Q-число $\tilde{x}$ называется *бесконечно-малым Q-числом*, если существует последовательность вещественных чисел $\langle x_n \rangle$, для которой: $\langle x_n \rangle \in \tilde{x}$, и для всех положительных вещественных чисел ε :

$$\{n \in \mathbf{N} \mid |x_n| < \varepsilon\} \in \mathbf{Fix}.$$

Обозначим множество всех бесконечно-малых Q-чисел как I .

Определение 2.12: Q-числа $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$ называются *бесконечно-близкими* (обозначение: $\tilde{x} \approx \tilde{y}$), если $|\tilde{x} - \tilde{y}| = 0$, или $|\tilde{x} - \tilde{y}|$ бесконечно мало.

Определение 2.13: Q-число $\tilde{x}$ называется *бесконечно большим*, если существует последовательность $\langle r_n \rangle$ вещественных чисел, для которой $\langle r_n \rangle \in \tilde{x}$, и для каждого натурального числа m :

$$\{n \in \mathbf{N} \mid m < r_n\} \in \mathbf{Fix}.$$

3 Классическая логика

Далее выражение "предложение" означает: "повествовательное предложение".

Определение 3.1: Предложение $\ll \Theta \gg$ называется *истинным*, если и только если Θ ¹.

Например: предложение "идет дождик" истинно, если и только если идет дождик.

Определение 3.2: Предложение $\ll \Theta \gg$ называется *ложным*, если и только если неверно, что Θ .

Определение 3.3: Предложения A и B *равны* ($A = B$), если A истинно, если и только если B истинно.

Далее мы используем обычные понятия классической пропозициональной логики [7].

Определение 3.4: Предложение C есть *конъюнкция* предложений A и B ($C = (A \wedge B)$), если C истинно, если и только если A истинно, и B истинно.

¹Это определение я видел у А.Tarski.

Определение 3.5: Предложение C есть *отрицание* предложения A ($C = \overline{A}$), если C истинно, если и только если A ложно.

Теорема 3.1:

- 1) $(A \wedge A) = A$;
- 2) $(A \wedge B) = (B \wedge A)$;
- 3) $(A \wedge (B \wedge C)) = ((A \wedge B) \wedge C)$;
- 4) если T истинное предложение, то для каждого предложения A : $(A \wedge T) = A$.

Определение 3.6: Каждая функция $\mathfrak{g}$, определенная в множестве предложений, имеющая область значений на двух-элементном множестве $\{0; 1\}$, называется *булевой функцией*, если:

- 1) для каждого предложения A : $\mathfrak{g}(\overline{A}) = 1 - \mathfrak{g}(A)$;
- 2) для всех предложений A и B : $\mathfrak{g}(A \wedge B) = \mathfrak{g}(A) \cdot \mathfrak{g}(B)$.

Определение 3.7: Множество предложений $\mathfrak{Z}$ называется *базисным*, если для любого элемента A этого множества найдутся булевы функции $\mathfrak{g}_1$ и $\mathfrak{g}_2$, для которых выполняются следующие условия:

- 1) $\mathfrak{g}_1(A) \neq \mathfrak{g}_2(A)$;
- 2) для каждого элемента B множества $\mathfrak{Z}$: если $B \neq A$, то $\mathfrak{g}_1(B) = \mathfrak{g}_2(B)$.

Определение 3.8: Множество предложений $[\mathfrak{Z}]$ называется *пропозициональным замыканием* множества $\mathfrak{Z}$, если выполняются следующие условия:

- 1) $\mathfrak{Z} \subseteq [\mathfrak{Z}]$;
- 1) если $A \in [\mathfrak{Z}]$, то $\overline{A} \in [\mathfrak{Z}]$;
- 2) если $A \in [\mathfrak{Z}]$, и $B \in [\mathfrak{Z}]$, то $(A \wedge B) \in [\mathfrak{Z}]$.

Далее элементы множества $[\mathfrak{Z}]$ называются $\mathfrak{Z}$ -предложениями.

Определение 3.9: $\mathfrak{Z}$ -предложение A называется *тавтологией*, если для всех булевых функций $\mathfrak{g}$:

$$\mathfrak{g}(A) = 1.$$

Определение 3.10: *Дизъюнкция* и *импликация* определяется обычным образом:

$$(A \vee B) = \overline{(\overline{A} \wedge \overline{B})},$$

$$(A \Rightarrow B) = (A \wedge \overline{B}).$$

Из этого Определения и из Определений 3.4 и 3.5:

$(A \vee B)$ есть ложное предложение, если и только если A есть ложное предложение, и B есть ложное предложение.

$(A \Rightarrow B)$ есть ложное предложение если и только если A есть истинное предложение, а B есть ложное предложение.

Определение 3.11: $\mathfrak{S}$ -предложение называется *пропозициональной аксиомой* [8], если это предложение имеет одну из следующих форм:

A1. $(A \Rightarrow (B \Rightarrow A))$;

A2. $((A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C)))$;

A3. $((\overline{B} \Rightarrow \overline{A}) \Rightarrow ((\overline{B} \Rightarrow A) \Rightarrow B))$.

Определение 3.12:

Предложение B получается из предложений $(A \Rightarrow B)$ и A по правилу "*modus ponens*".

Определение 3.13: [9] Последовательность $A_1, A_2, \dots, A_n$ предложений называется *пропозициональным выводом* предложения A из списка гипотез Γ (обозначение: $\Gamma \vdash A$), если $A_n = A$, и для всех чисел l ($1 \leq l \leq n$): A_l есть либо пропозициональная аксиома, либо A_l получена из каких-либо предложений A_{l-k} и A_{l-s} по *modus ponens*, либо $A_l \in \Gamma$.

Определение 3.14: Предложение *пропозиционально доказуемо*, если это предложение есть пропозициональная аксиома или получается из пропозиционально доказуемых предложений по правилу *modus ponens*.

Следовательно, если A пропозиционально доказуемо, то существует пропозициональный вывод

$$\vdash A.$$

Теорема 3.2: [10] Если предложение A пропозиционально доказуемо, то для всех булевых функций $\mathfrak{g}$: $\mathfrak{g}(A) = 1$.

Теорема 3.3: (Теорема о полноте). [11] Все тавтологии пропозиционально доказуемы.

4 В-функции

Определение 4.1: Каждая функция $\mathfrak{b}(x)$, определенная в множестве предложений, имеющая значения на отрезке $[0; 1]$ вещественной числовой оси, называется *В-функцией*, если для любых предложений A и B выполняется условие:

$$\mathfrak{b}(A \wedge B) + \mathfrak{b}(A \wedge \overline{B}) = \mathfrak{b}(A).$$

Теорема 4.1: Для каждой B -функции $\mathfrak{b}$:

- 1) для любых предложений A и B : $\mathfrak{b}(A \wedge B) \leq \mathfrak{b}(A)$;
- 2) для любого предложения A : если T истинное предложение, то $\mathfrak{b}(A) + \mathfrak{b}\overline{A} = \mathfrak{b}(T)$
- 3) для каждого предложения A : если T истинное предложение, то $\mathfrak{b}(A) \leq \mathfrak{b}(T)$;

Следовательно, если существует предложение C , для которого: $\mathfrak{b}(C) = 1$, и T - истинное предложение, то

$$\mathfrak{b}(T) = 1. \quad (1)$$

Следовательно, в этом случае для любого предложения A :

$$\mathfrak{b}(A) + \mathfrak{b}(\overline{A}) = 1. \quad (2)$$

Теорема 4.2: Если предложение D пропозиционально доказуемо, то для всех B -функций $\mathfrak{b}$: $\mathfrak{b}(D) = 1$.

Теорема 4.3:

- 1) Если для всех булевых функций $\mathfrak{g}$:

$$\mathfrak{g}(A) = 1,$$

то для всех B -функций $\mathfrak{b}$:

$$\mathfrak{b}(A) = 1.$$

- 2) если для всех булевых функций $\mathfrak{g}$:

$$\mathfrak{g}(A) = 0$$

то для всех B -функций $\mathfrak{b}$:

$$\mathfrak{b}(A) = 0.$$

Теорема 4.4: Все булевы функции являются B -функциями.

Следовательно, **B -функция есть обобщение логической булевой функции. Поэтому все B -функции - тоже логические функции.**

Теорема 4.5:

$$\mathfrak{b}(A \vee B) = \mathfrak{b}(A) + \mathfrak{b}(B) - \mathfrak{b}(A \wedge B).$$

Определение 4.2: Предложения A и B *несовместны для B -функции $\mathfrak{b}$* , если

$$\mathfrak{b}(A \wedge B) = 0.$$

Теорема 4.6: Если предложения A и B несовместны для $\mathfrak{b}$, то

$$\mathfrak{b}(A \vee B) = \mathfrak{b}(A) + \mathfrak{b}(B).$$

Теорема 4.7: Если $\mathfrak{b}(A \wedge B) = \mathfrak{b}(A) \cdot \mathfrak{b}(B)$, то $\mathfrak{b}(A \wedge \overline{B}) = \mathfrak{b}(A) \cdot \mathfrak{b}(\overline{B})$.

Теорема 4.8: $\mathfrak{b}(A \wedge \overline{A} \wedge B) = 0$.

5 Независимые испытания

Определение 5.1: Пусть $st(n)$ - функция, определенная на множестве натуральных чисел и имеющая значения в множестве $\mathfrak{Z}$ -предложений.

В этом случае, $\mathfrak{Z}$ -предложение A называется *$[st]$ -последовательностью ранга r с V -числом k* , если A , r и k подчиняются одному из следующих условий:

- 1) $r = 1$, и $k = 1$, $A = st(1)$, или $k = 0$, $A = \overline{st(1)}$;
- 2) B есть $[st]$ -последовательность ранга $r - 1$ с V -числом $k - 1$, и

$$A = (B \wedge st(r)),$$

или B есть $[st]$ -последовательность ранга $r - 1$ с V -числом k , и

$$A = (B \wedge \overline{st(r)}).$$

Обозначим множество $[st]$ -последовательностей ранга r с V -числом k как $[st](r, k)$.

Например, если $st(n)$ есть предложение B_n , то предложения:

$$(B_1 \wedge B_2 \wedge \overline{B_3}), (B_1 \wedge \overline{B_2} \wedge B_3), (\overline{B_1} \wedge B_2 \wedge B_3)$$

есть элементы множества $[st](3, 2)$, а $(B_1 \wedge B_2 \wedge \overline{B_3} \wedge B_4 \wedge \overline{B_5}) \in [st](5, 3)$.

Определение 5.2: Функция $st(n)$ *независима* для B -функции $\mathfrak{b}$, если для A : если $A \in [st](r, r)$, то:

$$\mathbf{b}(A) = \prod_{n=1}^r \mathbf{b}(\mathbf{st}(n)).$$

Определение 5.3: Пусть $\mathbf{st}(n)$ - функция, определенная на множестве натуральных чисел и имеющая значения в множестве $\mathfrak{F}$ -предложений.

В этом случае предложение A называется $[st]$ -дизъюнкцией ранга r с V -числом k (обозначение: $\mathbf{t}[st](r, k)$), если A есть дизъюнкция всех элементов множества $[st](r, k)$.

Например, если $\mathbf{st}(n)$ есть предложение C_n , то:

$$\begin{aligned} (\overline{C_1} \wedge \overline{C_2} \wedge \overline{C_3}) &= \mathbf{t}[st](3, 0), \\ \mathbf{t}[st](3, 1) &= ((C_1 \wedge \overline{C_2} \wedge \overline{C_3}) \vee (\overline{C_1} \wedge C_2 \wedge \overline{C_3}) \vee (\overline{C_1} \wedge \overline{C_2} \wedge C_3)), \\ \mathbf{t}[st](3, 2) &= ((C_1 \wedge C_2 \wedge \overline{C_3}) \vee (\overline{C_1} \wedge C_2 \wedge C_3) \vee (C_1 \wedge \overline{C_2} \wedge C_3)), \\ (C_1 \wedge C_2 \wedge C_3) &= \mathbf{t}[st](3, 3). \end{aligned}$$

Определение 5.4:

$\nu_r[st](A)$ называется частотой предложения A в $[st]$ -последовательности r независимых для B -функции $\mathbf{b}$ испытаний, если

- 1) $\mathbf{st}(n)$ независима для B -функции $\mathbf{b}$,
- 2) для всех n : $\mathbf{b}(\mathbf{st}(n)) = \mathbf{b}(A)$,
- 3) $\mathbf{t}[st](r, k) = \ll \nu_r[st](A) = \frac{k}{r} \gg$.

Теорема 5.1: (Формула Бернулли) [12] Если $\mathbf{st}(n)$ независима для B -функции $\mathbf{b}$, существует вещественное число p , для которого: для всех n : $\mathbf{b}(\mathbf{st}(n)) = p$, то

$$\mathbf{b}(\mathbf{t}[st](r, k)) = \frac{r!}{k! \cdot (r-k)!} \cdot p^k \cdot (1-p)^{r-k}.$$

Определение 5.5: Пусть $\mathbf{st}(n)$ - функция, определенная на множестве натуральных чисел и имеющая значения в множестве $\mathfrak{F}$ -предложений.

В этом случае функция $\mathfrak{T}[st](r, k, l)$, определенная на множестве троек натуральных чисел и имеющая значения в множестве $\mathfrak{F}$ -предложение, определяется как:

- 1) $\mathfrak{T}[st](r, k, k) = \mathbf{t}[st](r, k)$,
- 2) $\mathfrak{T}[st](r, k, l+1) = (\mathfrak{T}[st](r, k, l) \vee \mathbf{t}[st](r, l+1))$.

Определение 5.6: Если a и b - вещественные числа, для которых $k-1 < a \leq k$, и $l \leq b < l+1$, то $\mathfrak{T}[st](r, a, b) = \mathfrak{T}[st](r, k, l)$.

Теорема 5.2: Если $\nu_r [st] (A)$ - частота предложения A в $[st]$ -последовательности r независимых для В-функции $\mathbf{b}$ испытаний, то

$$\mathfrak{T}[st](r, a, b) = \ll \frac{a}{r} \leq \nu_r [st] (A) \leq \frac{b}{r} \gg .$$

Теорема 5.3: Если $st(n)$ независима для В-функции $\mathbf{b}$, существует вещественное число p , для которого: для всех n : $\mathbf{b} (st(n)) = p$, то

$$\mathbf{b} (\mathfrak{T}[st](r, a, b)) = \sum_{a \leq k \leq b} \frac{r!}{k! \cdot (r-k)!} \cdot p^k \cdot (1-p)^{r-k} .$$

Теорема 5.4: Если $st(n)$ независима для В-функции $\mathbf{b}$, существует вещественное число p , для которого: для всех n : $\mathbf{b} (st(n)) = p$, то для каждого положительного вещественного числа ε :

$$\mathbf{b} (\mathfrak{T}[st](r, r \cdot (p - \varepsilon), r \cdot (p + \varepsilon))) \geq 1 - \frac{p \cdot (1-p)}{r \cdot \varepsilon^2} .$$

6 Функция вероятности

Определение 6.1: Последовательности предложений $\langle A_n \rangle$ и $\langle B_n \rangle$ *Q-эквивалентны* (обозначение: $\langle A_n \rangle \sim \langle B_n \rangle$), если

$$\{n \in \mathbf{N} | A_n = B_n\} \in \Phi \mathbf{ix} .$$

Определение 6.2: *Q-предложение* есть множество Q-эквивалентных последовательностей предложений, т.е. если $\tilde{A}$ есть Q-предложение, и $\mathbf{B} \in \tilde{A}$, и $\mathbf{C} \in \tilde{A}$, то $\mathbf{B} \sim \mathbf{C}$; и если $\mathbf{B} \in \tilde{A}$, и $\mathbf{B} \sim \mathbf{C}$, то $\mathbf{C} \in \tilde{A}$.

Определение 6.3: Q-предложение $\tilde{A}$ называется *стандартным Q-предложением* A , если A есть некоторое предложение, и существует последовательность $\langle B_n \rangle$, для которой: $\langle B_n \rangle \in \tilde{A}$, и

$$\{n \in \mathbf{N} | B_n = A\} \in \Phi \mathbf{ix} .$$

Определение 6.4: Q-предложения $\tilde{A}$ и $\tilde{B}$ *равны* (обозначение: $\tilde{A} = \tilde{B}$), если $\tilde{A} \subseteq \tilde{B}$, и $\tilde{B} \subseteq \tilde{A}$.

Определение 6.5: Функция $\tilde{\mathbf{f}}$, определенная в множестве Q-предложений, имеющая значения в множестве Q-чисел, называется *Q-расширением функции* $\mathbf{f}$, определенной в множестве предложений и имеющей значения в множестве вещественных чисел, если выполняется следующее условие:

если $\langle B_n \rangle \in \tilde{B}$, и $\tilde{f}(\tilde{B}) = \tilde{x}$, то $\langle f(B_n) \rangle \in \tilde{x}$.

Определение 6.6: Функция $\tilde{\mathfrak{T}}$, определенная в $QR \times QR \times QR$, имеющая значения в множестве Q-предложений, называется *Q-расширением функции $\mathfrak{T}$* , определенной в $R \times R \times R$ и имеющей значения в множестве предложений, если выполняется следующее условие:

если $\langle x_n \rangle \in \tilde{x}$, $\langle y_n \rangle \in \tilde{y}$, $\langle z_n \rangle \in \tilde{z}$, $\tilde{u} = \tilde{\mathfrak{T}}(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$, то $\langle \mathfrak{T}(x_n, y_n, z_n) \rangle \in \tilde{u}$.

Теорема 6.1: Пусть x, y, z - стандартные Q-числа, B - стандартное Q-предложение, $\tilde{f}$ - Q-расширение функции f , определенной в множестве предложений и имеющей значения в множестве вещественных чисел.

Пусть $\tilde{\mathfrak{T}}$ - Q-расширение функции $\mathfrak{T}$, определенной в $R \times R \times R$ и имеющей значения в множестве предложений.

В этом случае:

- 1) если $\tilde{f}(B) = x$, то $f(B) = x$ и vice versa;
- 2) если $\tilde{\mathfrak{T}}(x, y, z) = \tilde{B}$, то $\mathfrak{T}(x, y, z) = B$ и vice versa;

По этой Теореме: если $\tilde{f}$ и $\tilde{\mathfrak{T}}$ - Q-расширения функций f и $\mathfrak{T}$, соответственно, то выражения типа: " $\tilde{f}$ " и " $\tilde{\mathfrak{T}}$ " будут обозначаться как: " f " и " $\mathfrak{T}$ " соответственно. А если $\tilde{B}$ - стандартное Q-предложение B , то выражение вида: " $\tilde{B}$ " будет обозначаться как: " B ".

Теорема 6.2: Для всех Q-чисел $\tilde{\varepsilon}$ и $\tilde{r}$, для всех функций $st(n)$, независимых для В-функции b :

если $\tilde{\varepsilon} > 0$, и существует вещественное число p , для которого: для всех натуральных n : $st(n) = p$, то

$$b(\mathfrak{T}[st](\tilde{r}, \tilde{r} \cdot (p - \tilde{\varepsilon}), \tilde{r} \cdot (p + \tilde{\varepsilon}))) \geq 1 - \frac{p \cdot (1 - p)}{\tilde{r} \cdot \tilde{\varepsilon}^2}.$$

Теорема 6.3: Если $\tilde{r}$ - бесконечно большое Q-число, то для всех вещественных положительных чисел ε , для всех функций $st(n)$, независимых для В-функции b :

если существует вещественное число p , для которого: для всех натуральных n : $st(n) = p$, то

$$b(\mathfrak{T}[st](\tilde{r}, \tilde{r} \cdot (p - \tilde{\varepsilon}), \tilde{r} \cdot (p + \tilde{\varepsilon}))) \approx 1.$$

Определение 6.7: Предложение $\ll \Theta \gg$ есть *почти достоверное предложение*, если реально, что Θ^2 .

Определение 6.8: Функция $\mathfrak{P}$ называется *P-функцией*, если $\mathfrak{P}$ есть Q-расширение В-функции, и выполняется следующее условие:

²Подробнее об этих понятиях: APPENDIX I. Непротиворечивость

для всех Q-предложений $\tilde{A}$: если $\mathfrak{P}(\tilde{A}) \approx 1$, то $\tilde{A}$ почти достоверное предложение.

Теорема 6.4: Если $\tilde{r}$ - бесконечно большое Q-число, $\nu_{\tilde{r}}[st](A)$ - частота предложения A в $[st]$ -последовательности $\tilde{r}$ независимых для P-функции $\mathfrak{P}$ испытаний, то реально, что для каждого вещественного положительного числа ε :

$$|\nu_{\tilde{r}}[st](A) - \mathfrak{P}(A)| < \varepsilon.$$

Теорема 6.5: Если $\tilde{r}$ - бесконечно большое Q-число, $\nu_{\tilde{r}}[st](A)$ - частота предложения A в $[st]$ -последовательности $\tilde{r}$ независимых для P-функции $\mathfrak{P}$ испытаний, то реально, что

$$\nu_{\tilde{r}}[st](A) \approx \mathfrak{P}(A).$$

Следовательно, **функция, определенная по 6.8 имеет статистический смысл.** Поэтому я называю такую функцию *функцией вероятности*.

7 Заключение

Функция вероятности есть расширение логической В-функции. Следовательно, **вероятность есть обобщение классической пропозициональной логики.**

8 APPENDIX I. Непротиворечивость

Определим пропозициональное исчисление как в [7], но пропозициональные формы будем обозначать строчными греческими буквами.

Определение C1: Множество $\mathfrak{R}$ пропозициональных форм is *U-мир*, если:

- 1) если $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathfrak{R}$, и $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \vdash \beta$, то $\beta \in \mathfrak{R}$,
- 2) для всех пропозициональных форм α : неверно, что $(\alpha \& (\neg\alpha)) \in \mathfrak{R}$,
- 3) для каждой пропозициональной формы α : $\alpha \in \mathfrak{R}$ or $(\neg\alpha) \in \mathfrak{R}$.

Определение C2: Последовательности пропозициональных форм $\langle \alpha_n \rangle$ и $\langle \beta_n \rangle$ *Q-эквивалентны* (обозначение: $\langle \alpha_n \rangle \sim \langle \beta_n \rangle$) if

$$\{n \in \mathbf{N} | \alpha_n \equiv \beta_n\} \in \Phi\mathbf{ix}.$$

Определяем понятия *Q-формы* и *Q-расширения функции* для пропозициональных форм как в Определениях 2.5, 6.2, 2.9, 6.5, 6.6.

Определение С3: Q-форма $\tilde{\alpha}$ *реальна* в U-мире $\mathfrak{R}$, если существует последовательность $\langle \alpha_n \rangle$ пропозициональных форм, для которой: $\langle \alpha_n \rangle \in \tilde{\alpha}$, и

$$\{n \in \mathbf{N} | \alpha_n \in \mathfrak{R}\} \in \Phi \mathbf{x}.$$

Определение С4: Множество $\tilde{\mathfrak{R}}$ Q-форм называется *Q-расширением U-мира* $\mathfrak{R}$, если $\mathfrak{R}$ есть множество Q-реальных в $\mathfrak{R}$ Q-форм.

Определение С5: Последовательность $\langle \tilde{\mathfrak{R}}_k \rangle$ Q-расширений U-мира называется *S-миром*.

Определение С6: Q-форма $\tilde{\alpha}$ *реальна* в S-мире $\langle \tilde{\mathfrak{R}}_k \rangle$, если

$$\{k \in \mathbf{N} | \tilde{\alpha} \in \tilde{\mathfrak{R}}_k\} \in \Phi \mathbf{x}.$$

Определение С7: Множество $\mathbf{A}$ ($\mathbf{A} \subseteq \mathbf{N}$) называется *регулярным множеством*, еали для каждого вещественного положительного числа ε существует натуральное число n_0 , такое, что: для всех натуральных чисел n и m , больших или равных n_0 :

$$|w_n(\mathbf{A}) - w_m(\mathbf{A})| < \varepsilon.$$

Теорема С1: Если $\mathbf{A}$ регулярное множество, и для всех вещественных положительных чисел ε :

$$\{k \in \mathbf{N} | w_k(\mathbf{A}) < \varepsilon\} \in \Phi \mathbf{x},$$

то

$$\lim_{k \rightarrow \infty} w_k(\mathbf{A}) = 0.$$

Доказательство Теоремы С1: Допустим,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} w_k(\mathbf{A}) \neq 0.$$

То есть существует вещественное число ε_0 , такое, что для каждого натурального числа n' существует натуральное число n , для которого:

$$n > n', \text{ и } w_n(\mathbf{A}) > \varepsilon_0.$$

Пусть δ_0 - некоторое положительное вещественное число, для которого: $\varepsilon_0 - \delta_0 > 0$. Т.к. $\mathbf{A}$ - регулярное множество, то для δ_0 существует натуральное число n_0 , такое, что для всех натуральных n и m , больших или равных числу n_0 :

$$|w_m(\mathbf{A}) - w_n(\mathbf{A})| < \delta_0.$$

То есть

$$w_m(\mathbf{A}) > w_n(\mathbf{A}) - \delta_0.$$

Т.к. $w_n(\mathbf{A}) \geq \varepsilon_0$, то $w_m(\mathbf{A}) \geq \varepsilon_0 - \delta_0$.

Следовательно, существует натуральное n_0 , такое, что для всех натуральных m : если $m \geq n_0$, то $w_m(\mathbf{A}) \geq \varepsilon_0 - \delta_0$.

Следовательно,

$$\{m \in \mathbf{N} | w_m(\mathbf{A}) \geq \varepsilon_0 - \delta_0\} \in \Phi \mathbf{ix},$$

и по условию этой Теоремы:

$$\{k \in \mathbf{N} | w_k(\mathbf{A}) < \varepsilon_0 - \delta_0\} \in \Phi \mathbf{ix}.$$

Таким образом,

$$\{k \in \mathbf{N} | \varepsilon_0 - \delta_0 < \varepsilon_0 - \delta_0\} \in \Phi \mathbf{ix}.$$

Т.е. $\emptyset \notin \Phi \mathbf{ix}$. Это противоречит Теореме 2.2.

Определение С8: Пусть $\langle \tilde{\mathfrak{R}}_k \rangle$ - S-мир.

В этом случае функция $\mathfrak{W}(\tilde{\beta})$, определенная в множестве Q-форм и имеющая значения в $Q\mathbf{R}$, определяется следующим образом:

если $\mathfrak{W}(\tilde{\beta}) = \tilde{p}$, то существует последовательность $\langle p_n \rangle$ вещественных чисел, таких, что: $\langle p_n \rangle \in \tilde{p}$, и

$$p_n = w_n \left(\left\{ k \in \mathbf{N} | \tilde{\beta} \in \tilde{\mathfrak{R}}_k \right\} \right).$$

Теорема С2: Если $\left\{ k \in \mathbf{N} | \tilde{\beta} \in \tilde{\mathfrak{R}}_k \right\}$ - регулярное множество, и $\mathfrak{W}(\tilde{\beta}) \approx 1$, то $\tilde{\beta}$ реальна в $\langle \tilde{\mathfrak{R}}_k \rangle$.

Доказательство Теоремы С2: Т.к. $\mathfrak{W}(\tilde{\beta}) \approx 1$, то по Определениям 2.12 и 2.11: для всех положительных вещественных чисел ε :

$$\left\{n \in \mathbf{N} \mid w_n \left(\left\{k \in \mathbf{N} \mid \tilde{\beta} \in \tilde{\mathfrak{R}}_k \right\} \right) > 1 - \varepsilon \right\} \in \Phi \mathbf{ix}.$$

Следовательно, по пункту 3 Теоремы 2.1: для всех положительных вещественных ε :

$$\left\{n \in \mathbf{N} \mid \left(\mathbf{N} - w_n \left(\left\{k \in \mathbf{N} \mid \tilde{\beta} \in \tilde{\mathfrak{R}}_k \right\} \right) \right) < \varepsilon \right\} \in \Phi \mathbf{ix}.$$

Таким образом, по Теореме C1:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\mathbf{N} - w_n \left(\left\{k \in \mathbf{N} \mid \tilde{\beta} \in \tilde{\mathfrak{R}}_k \right\} \right) \right) = 0.$$

Т.е.:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} w_n \left(\left\{k \in \mathbf{N} \mid \tilde{\beta} \in \tilde{\mathfrak{R}}_k \right\} \right) = 1.$$

Следовательно, по Определению 2.3:

$$\left\{k \in \mathbf{N} \mid \tilde{\beta} \in \tilde{\mathfrak{R}}_k \right\} \in \Phi \mathbf{ix}.$$

И по Определению C6: $\tilde{\beta}$ реальна в $\langle \tilde{\mathfrak{R}}_k \rangle$.

Теорема C3: Существует Р-функция.

Доказательство Теоремы C3: По Теоремам C2 и 2.1: $\mathfrak{W}(\tilde{\beta})$ есть Р-функция в $\langle \tilde{\mathfrak{R}}_k \rangle$.

9 APPENDIX II. Доказательства

Этот Appendix содержит доказательства Теорем:

Доказательство Теоремы 2.1: Это очевидно.

Доказательство Теоремы 2.2: Из пункта 3 Теоремы 2.1:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varpi_n(\mathbf{N} - \mathbf{B}) = 0.$$

Из пункта 4 Теоремы 2.1:

$$\varpi_n(\mathbf{A} \cap (\mathbf{N} - \mathbf{B})) \leq \varpi_n(\mathbf{N} - \mathbf{B}).$$

Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varpi_n(\mathbf{A} \cap (\mathbf{N} - \mathbf{B})) = 0.$$

Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varpi_n(\mathbf{A} \cap \mathbf{B}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varpi_n(\mathbf{A}).$$

Доказательство Теоремы 2.3: По Определению 2.4 из Теоремы 2.2 - это очевидно.

Доказательство Теоремы 2.4: Обозначим:

если $k = 1$, или $k = 2$, или $k = 3$, то

$$\mathbf{A}_k = \{n \in \mathbf{N} | y_{k,n} = z_{k,n}\}.$$

В этом случае по Определению 2.4 для всех k :

$$\mathbf{A}_k \in \Phi \mathbf{x}.$$

Т.к.

$$(\mathbf{A}_1 \cap \mathbf{A}_2 \cap \mathbf{A}_3) \subseteq \{n \in \mathbf{N} | f(y_{1,n}, y_{2,n}, y_{3,n}) = f(z_{1,n}, z_{2,n}, z_{3,n})\},$$

то по Теореме 2.2:

$$\{n \in \mathbf{N} | f(y_{1,n}, y_{2,n}, y_{3,n}) = f(z_{1,n}, z_{2,n}, z_{3,n})\} \in \Phi \mathbf{x}.$$

Доказательство Теоремы 2.5: Если $\langle r_n \rangle \in \tilde{a}$, $\langle s_n \rangle \in \tilde{b}$, $\langle u_n \rangle \in \tilde{c}$, $\langle t_n \rangle \in \tilde{d}$, то по Определению 2.6:

$$\begin{aligned} \{n \in \mathbf{N} | r_n = a\} &\in \Phi \mathbf{x}, \\ \{n \in \mathbf{N} | s_n = b\} &\in \Phi \mathbf{x}, \\ \{n \in \mathbf{N} | u_n = c\} &\in \Phi \mathbf{x}, \\ \{n \in \mathbf{N} | t_n = d\} &\in \Phi \mathbf{x}. \end{aligned}$$

1) Пусть $d = f(a, b, c)$.

В этом случае по Теореме 2.2:

$$\{n \in \mathbf{N} | t_n = f(r_n, s_n, u_n)\} \in \Phi \mathbf{x}.$$

Следовательно, по Определению 2.4:

$$\langle t_n \rangle \sim \langle \mathfrak{f}(r_n, s_n, u_n) \rangle.$$

Таким образом, по Определению 2.5:

$$\langle \mathfrak{f}(r_n, s_n, u_n) \rangle \in \tilde{d}.$$

Следовательно, по Определению 2.9:

$$\tilde{d} = \tilde{\mathfrak{f}}(\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}).$$

2) Пусть $\tilde{d} = \tilde{\mathfrak{f}}(\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c})$.

В этом случае по Определению 2.9:

$$\langle \mathfrak{f}(r_n, s_n, u_n) \rangle \in \tilde{d}.$$

Следовательно, по Определению 2.5:

$$\langle t_n \rangle \sim \langle \mathfrak{f}(r_n, s_n, u_n) \rangle.$$

Таким образом, по Определению 2.4:

$$\{n \in \mathbf{N} | t_n = \mathfrak{f}(r_n, s_n, u_n)\} \in \Phi \mathbf{ix}.$$

Следовательно, по Теореме 2.2:

$$\{n \in \mathbf{N} | t_n = \mathfrak{f}(r_n, s_n, u_n), r_n = a, s_n = b, u_n = c, t_n = d\} \in \Phi \mathbf{ix}.$$

Следовательно, т.к. это множество не пусто, то

$$d = \mathfrak{f}(a, b, c).$$

Доказательство Теоремы 2.6: Если $\langle x_n \rangle \in \tilde{x}$, $\langle y_n \rangle \in \tilde{y}$, $\langle z_n \rangle \in \tilde{z}$, $\tilde{u} = \varphi(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$, то по Определению 2.9: $\langle \varphi(x_n, y_n, z_n) \rangle \in \tilde{u}$.

Т.к. $\varphi(x_n, y_n, z_n) = \psi(x_n, y_n, z_n)$, то $\langle \psi(x_n, y_n, z_n) \rangle \in \tilde{u}$.

Если $\tilde{v} = \psi(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$, то по Определению 2.9: $\langle \psi(x_n, y_n, z_n) \rangle \in \tilde{v}$, тоже.

Таким образом, для всех последовательностей $\langle t_n \rangle$ вещественных чисел: если $\langle t_n \rangle \in \tilde{u}$, то по Определению 2.5: $\langle t_n \rangle \sim \langle \psi(x_n, y_n, z_n) \rangle$.

Следовательно, $\langle t_n \rangle \in \tilde{v}$; и если $\langle t_n \rangle \in \tilde{v}$, то $\langle t_n \rangle \sim \langle \varphi(x_n, y_n, z_n) \rangle$; Следовательно, $\langle t_n \rangle \in \tilde{u}$.

Таким образом, $\tilde{u} = \tilde{v}$.

Доказательство Теоремы 2.7: Пусть $\langle w_n \rangle \in \tilde{w}$, $f(\tilde{x}, \tilde{w}) = \tilde{u}$, $\langle x_n \rangle \in \tilde{x}$, $\langle y_n \rangle \in \tilde{y}$, $\langle z_n \rangle \in \tilde{z}$, $\varphi(\tilde{y}, \tilde{z}) = \tilde{w}$, $\psi(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}) = \tilde{v}$.

По условию этой Теоремы: $f(x_n, \varphi(y_n, z_n)) = \psi(x_n, y_n, z_n)$.

по Определению 2.9: $\langle \psi(x_n, y_n, z_n) \rangle \in \tilde{v}$, $\langle \varphi(x_n, y_n) \rangle \in \tilde{w}$, $\langle f(x_n, w_n) \rangle \in \tilde{u}$.

Для всех последовательностей $\langle t_n \rangle$ вещественных чисел:

1) Если $\langle t_n \rangle \in \tilde{v}$, то Определению 2.5: $\langle t_n \rangle \sim \langle \psi(x_n, y_n, z_n) \rangle$.

Следовательно, $\langle t_n \rangle \sim \langle f(x_n, \varphi(y_n, z_n)) \rangle$.

Таким образом, по Определению 2.4:

$$\{n \in \mathbf{N} | t_n = f(x_n, \varphi(y_n, z_n))\} \in \Phi \mathbf{ix},$$

и

$$\{n \in \mathbf{N} | w_n = \varphi(y_n, z_n)\} \in \Phi \mathbf{ix}.$$

Следовательно, по Теореме 2.2:

$$\{n \in \mathbf{N} | t_n = f(x_n, w_n)\} \in \Phi \mathbf{ix}.$$

Следовательно, по Определению 2.4:

$$\langle t_n \rangle \sim \langle f(x_n, w_n) \rangle.$$

Таким образом, по Определению 2.5: $\langle t_n \rangle \in \tilde{u}$.

2) Если $\langle t_n \rangle \in \tilde{u}$, то Определению 2.5: $\langle t_n \rangle \sim \langle f(x_n, w_n) \rangle$.

Т.к. $\langle w_n \rangle \sim \langle \varphi(y_n, z_n) \rangle$, то по Определению 2.4:

$$\{n \in \mathbf{N} | t_n = f(x_n, w_n)\} \in \Phi \mathbf{ix},$$

$$\{n \in \mathbf{N} | w_n = \varphi(y_n, z_n)\} \in \Phi \mathbf{ix}.$$

Таким образом, по Теореме 2.2:

$$\{n \in \mathbf{N} | t_n = f(x_n, \varphi(y_n, z_n))\} \in \Phi\mathbf{x}.$$

Следовательно, по Определению 2.4:

$$\langle t_n \rangle \sim \langle f(x_n, \varphi(y_n, z_n)) \rangle.$$

Таким образом,

$$\langle t_n \rangle \sim \langle \psi(x_n, y_n, z_n) \rangle.$$

Следовательно, по Определению 2.5: $\langle t_n \rangle \in \tilde{v}$.

Отсюда и из 1) по Определению 2.7: $\tilde{u} = \tilde{v}$.

Доказательство Теоремы 2.8: Если $\langle x_n \rangle \in \tilde{x}$, то $\tilde{y}$ есть $\mathbf{Q}$ -число, содержащее $\langle -x_n \rangle$.

Доказательство Теоремы 2.9: очевидно из Определения 2.6 и Определения 2.7.

Доказательство Теоремы 2.10: очевидно из Определения 2.10 по Теореме 2.2.

Доказательство Теоремы 2.11: Если $\langle x_n \rangle \in \tilde{x}$, то по Определению 2.10: если

$$\mathbf{A} = \{n \in \mathbf{N} | 0 < |x_n|\},$$

то $\mathbf{A} \in \Phi\mathbf{x}$.

В этом случае: если для последовательности $\langle y_n \rangle$: если $n \in \mathbf{A}$ then $y_n = 1/x_n$

- то

$$\{n \in \mathbf{N} | x_n \cdot y_n = 1\} \in \Phi\mathbf{x}.$$

Доказательство Теоремы 3.1: Это очевидно.

Доказательство Теоремы 3.2: в [10].

Доказательство Теоремы 3.3: в [11].

Доказательство Теоремы 4.1:

1) Это очевидно.

2) Из пунктов 4 и 2 Теоремы 3.1: $\mathbf{b}(T \wedge A) + \mathbf{b}(T \wedge \overline{A}) = \mathbf{b}(A) + \mathbf{b}(\overline{A})$.

3) Это очевидно.

Доказательство Теоремы 4.2:

Если D есть A1, то по Определению.3.10:

$$\mathfrak{b}(D) = \mathfrak{b}\left(\overline{\left(A \wedge \overline{(B \wedge \overline{A})}\right)}\right).$$

По (2):

$$\mathfrak{b}(D) = 1 - \mathfrak{b}\left(A \wedge \overline{(B \wedge \overline{A})}\right).$$

по Определению 4.1 и по Теореме 3.1:

$$\begin{aligned}\mathfrak{b}(D) &= 1 - \mathfrak{b}(A) + \mathfrak{b}\left(A \wedge \overline{(B \wedge \overline{A})}\right), \\ \mathfrak{b}(D) &= 1 - \mathfrak{b}(A) + \mathfrak{b}(A) - \mathfrak{b}\left(A \wedge (B \wedge \overline{A})\right), \\ \mathfrak{b}(D) &= 1 - \mathfrak{b}\left((A \wedge B) \wedge \overline{A}\right), \\ \mathfrak{b}(D) &= 1 - \mathfrak{b}(A \wedge B) + \mathfrak{b}\left((A \wedge B) \wedge A\right), \\ \mathfrak{b}(D) &= 1 - \mathfrak{b}(A \wedge B) + \mathfrak{b}\left((A \wedge A) \wedge B\right), \\ \mathfrak{b}(D) &= 1 - \mathfrak{b}(A \wedge B) + \mathfrak{b}(A \wedge B).\end{aligned}$$

Доказательство подобно остальным пропозициональным аксиомам.

Пусть для всех В-функций $\mathfrak{b}$: $\mathfrak{b}(A) = 1$ и $\mathfrak{b}(A \Rightarrow D) = 1$.

по Определению.3.10:

$$\mathfrak{b}(A \Rightarrow D) = \mathfrak{b}\left(\overline{A \wedge \overline{D}}\right).$$

По (2):

$$\mathfrak{b}(A \Rightarrow D) = 1 - \mathfrak{b}(A \wedge \overline{D}).$$

Следовательно,

$$\mathfrak{b}(A \wedge \overline{D}) = 0.$$

по Определению.4.1:

$$\mathfrak{b}(A \wedge \overline{D}) = \mathfrak{b}(A) - \mathfrak{b}(A \wedge D).$$

Следовательно,

$$\mathfrak{b}(A \wedge D) = \mathfrak{b}(A) = 1.$$

по Определению 4.1 и по Теореме 3.1:

$$\mathfrak{b}(A \wedge D) = \mathfrak{b}(D) - \mathfrak{b}(D \wedge \overline{A}) = 1.$$

Таким образом, для всех В-функций $\mathfrak{b}$:

$$\mathfrak{b}(D) = 1.$$

Доказательство Теоремы 4.3:

1) Это следует из предыдущей Теоремы и из Теоремы 3.3.

2) If for all Boolean functions $\mathfrak{g}$: $\mathfrak{g}(A) = 0$, then по Определению 3.6: $\mathfrak{g}(\overline{A}) = 1$. Следовательно, by the point 1 of this Теорема: for all В-function $\mathfrak{b}$: $\mathfrak{b}(\overline{A}) = 1$. By (2): $\mathfrak{b}(A) = 0$.

Доказательство Теоремы 4.4: по Определению 3.6: for all Boolean functions $\mathfrak{g}$:

$$\mathfrak{g}(A \wedge B) + \mathfrak{g}(A \wedge \overline{B}) = \mathfrak{g}(A) \cdot \mathfrak{g}(B) + \mathfrak{g}(A) \cdot (1 - \mathfrak{g}(B)) = \mathfrak{g}(A).$$

Доказательство Теоремы 4.5: по Определению 3.10 and (2):

$$\mathfrak{b}(A \vee B) = 1 - \mathfrak{b}(\overline{A} \wedge \overline{B}).$$

по Определению 4.1:

$$\mathfrak{b}(A \vee B) = 1 - \mathfrak{b}(\overline{A}) + \mathfrak{b}(\overline{A} \wedge B) = \mathfrak{b}(A) + \mathfrak{b}(B) - \mathfrak{b}(A \wedge B).$$

Доказательство Теоремы 4.6: Это следует из предыдущей Теоремы and Определения.

Доказательство Теоремы 4.7: по Определению 4.1:

$$\mathfrak{b}(A \wedge \overline{B}) = \mathfrak{b}(A) - \mathfrak{b}(A \wedge B).$$

Следовательно,

$$\mathfrak{b}(A \wedge \overline{B}) = \mathfrak{b}(A) - \mathfrak{b}(A) \cdot \mathfrak{b}(B) = \mathfrak{b}(A) \cdot (1 - \mathfrak{b}(B)).$$

Следовательно, по (2):

$$\mathfrak{b}(A \wedge \overline{B}) = \mathfrak{b}(A) \cdot \mathfrak{b}(\overline{B}).$$

Доказательство Теоремы 4.8: по Определению 4.1 и по пунктам 2 и 3 Теоремы 3.1:

$$\mathfrak{b}(A \wedge \overline{A} \wedge B) = \mathfrak{b}(A \wedge B) - \mathfrak{b}(A \wedge A \wedge B),$$

Следовательно, по пункту 1 Теоремы 3.1:

$$\mathfrak{b}(A \wedge \overline{A} \wedge B) = \mathfrak{b}(A \wedge B) - \mathfrak{b}(A \wedge B).$$

Доказательство Теоремы 5.1: по Определению 5.2 по Теореме 4.7: если $B \in [\mathfrak{st}](r, k)$, то:

$$\mathfrak{b}(B) = p^k \cdot (1 - p)^{r-k}.$$

Т.к. $[\mathfrak{st}](r, k)$ содержит $\frac{r!}{k!(r-k)!}$ элементов, то по Теоремам 4.8 и 4.6 эта Теорема выполняется.

Доказательство Теоремы 5.2: по Определению 5.6: существуют натуральные числа r и k , такие, что: $k - 1 < a \leq k$ and $l \leq b < l + 1$.

Индукция по l :

1. Пусть $l = k$.

В этом случае по Определению 5.4:

$$\mathfrak{I}[\mathfrak{st}](r, k, k) = \mathfrak{t}[\mathfrak{st}](r, k) = \ll \nu_r[\mathfrak{st}](A) = \frac{k}{r} \gg.$$

2. Пусть n - натуральное число.

Индуктивное допущение: Допустим

$$\mathfrak{I}[\mathfrak{st}](r, k, k + n) = \ll \frac{k}{r} \leq \nu_r[\mathfrak{st}](A) \leq \frac{k + n}{r} \gg.$$

по Определению 5.5:

$$\mathfrak{I}[\mathfrak{st}](r, k, k + n + 1) = (\mathfrak{I}[\mathfrak{st}](r, k, k + n) \vee \mathfrak{t}[\mathfrak{st}](r, k + n + 1)).$$

По индуктивному допущению и по Определению 5.4:

$$\begin{aligned} & \mathfrak{T}[st](r, k, k + n + 1) = \\ & = (\ll \frac{k}{r} \leq \nu_r[st](A) \leq \frac{k + n}{r} \gg \vee \ll \nu_r[st](A) = \frac{k + n + 1}{r} \gg). \end{aligned}$$

Следовательно, по Определению 3.10:

$$\mathfrak{T}[st](r, k, k + n + 1) = \ll \frac{k}{r} \leq \nu_r[st](A) \leq \frac{k + n + 1}{r} \gg.$$

Доказательство Теоремы 5.3: Это слудует из Теоремы 5.1 по Теореме 4.6.

Доказательство Теоремы 5.4: Т.к.

$$\sum_{k=0}^r (k - r \cdot p)^2 \cdot \frac{r!}{k! \cdot (r - k)!} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{r-k} = r \cdot p \cdot (1 - p),$$

то если

$$J = \{k \in \mathbf{N} | 0 \leq k \leq r \cdot (p - \varepsilon)\} \cap \{k \in \mathbf{N} | r \cdot (p + \varepsilon) \leq k \leq r\},$$

то

$$\sum_{k \in J} \frac{r!}{k! \cdot (r - k)!} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{r-k} \leq \frac{p \cdot (1 - p)}{r \cdot \varepsilon^2}.$$

Следовательно, по (2) эта Теорема выполняется.

Доказательство Теоремы 6.1: is in common with the Доказательством Теоремы 2.5.

Доказательство Теоремы 6.2: Это слудует из предыдущей Теоремы и из Теоремы 5.4 и Определения 2.10.

Доказательство Теоремы 6.3: по Определению.2.13: существует последовательность $\langle r_n \rangle$ вещественных чисел, такая, что $\langle r_n \rangle \in \tilde{r}$, и для каждого натурального числа m :

$$\{n \in \mathbf{N} | m < r_n\} \in \Phi \mathbf{x}.$$

Следовательно, для всех вещественных положительных чисел δ :

$$\left\{ n \in \mathbf{N} \mid \frac{p \cdot (1-p)}{\tilde{r} \cdot \tilde{\varepsilon}^2} < \delta \right\} \in \mathbf{Fix}.$$

Таким образом, по Определению.2.11: $\frac{p \cdot (1-p)}{\tilde{r} \cdot \tilde{\varepsilon}^2}$ - бесконечно малое. Т.к. по Определению.4.1 $\mathbf{b} \leq 1$, то по Определению.2.12: из Теоремы 6.2 эта Теорема выполняется.

Доказательство Теоремы 6.4: по Теореме 6.3:

$$\mathfrak{P}(\mathfrak{T}[st](\tilde{r}, \tilde{r} \cdot (\mathfrak{P}(A) - \tilde{\varepsilon}), \tilde{r} \cdot (\mathfrak{P}(A) + \tilde{\varepsilon}))) \approx 1.$$

По Определению 6.8: Предложение

$$\mathfrak{T}[st](\tilde{r}, \tilde{r} \cdot (\mathfrak{P}(A) - \tilde{\varepsilon}), \tilde{r} \cdot (\mathfrak{P}(A) + \tilde{\varepsilon}))$$

- почти достоверное предложение.

По Теореме 5.2:

$$\mathfrak{T}[st](\tilde{r}, \tilde{r} \cdot (\mathfrak{P}(A) - \tilde{\varepsilon}), \tilde{r} \cdot (\mathfrak{P}(A) + \tilde{\varepsilon})) =$$

$$= \ll (\mathfrak{P}(A) - \tilde{\varepsilon}) \leq \nu_{\tilde{r}}[st](A) \leq (\mathfrak{P}(A) + \tilde{\varepsilon}) \gg.$$

Следовательно, по Определению 6.7: Реально, что $(\mathfrak{P}(A) - \tilde{\varepsilon}) \leq \nu_{\tilde{r}}[st](A) \leq (\mathfrak{P}(A) + \tilde{\varepsilon})$.

Доказательство Теоремы 6.5: Т.к. из Теоремы 6.4 реально, что для каждого вещественного положительного числа ε :

$$|\nu_{\tilde{r}}[st](A) - \mathfrak{P}(A)| < \varepsilon,$$

то по Определению 2.11: $|\nu_{\tilde{r}}[st](A) - \mathfrak{P}(A)|$ бесконечно малое Q-число. Следовательно, по Определению 2.12 эта Теорема выполняется.

References

- [1] Я. Бернулли, *Закон больших чисел*, ("Наука", М.) 1986
- [2] М. Дэвис, *Прикладной нестандартный анализ*, ("Наука", М.) 1980, p.32
- [3] Item

- [4] Item, p.73
- [5] Item, p.73
- [6] Item, p.74
- [7] Эллиот Мендельсон, *Введение в математическую логику*, ("Наука", М.) 1971
- [8] Item, p.38
- [9] Item, p.37
- [10] Item, p.43
- [11] Item, p.44
- [12] Я. Бернулли, *Закон больших чисел*, ("Наука", М.) 1986, p.57